

ISKOLAI KÁBÍTÓSZER PREVENCIÓ

Kábítószeresek – néhány szó a valóságról



- *Különböző drogok, különböző módon hatnak ?*
- *Miért fogyasztanak drogot az emberek?*
- *Mit jelentenek a tablettákon a képek ?*
- *Minden drog veszélyes ?*
- *A marihuána biztonságos ?*
- *Hogyan is merhetem fel, ha a gyermekem drogozik ?*

Kábítószer=Drog?

- A drogfogalom tágabb, drognak nevezünk minden olyan szert, mely az emberi **szervezetbe juttatva megváltoztatja annak működését.**



A Drog fogalmán belüli csoportok

- - Legális: cigaretta, alkohol,
- - Illegális: kábítószer
- - **Átmenetek:** gyógyszerek

Az agy 3D SPECT képe egy egészséges és egy THC-t fogyasztó egyén esetében (krónikus fogyasztás hatása)

normál agy

rendszeres fogyasztó, de 24
órája már nem „szívott”



Anglia: 2004 B → C; 2007:skunk 25xTHC

A HAMISÍTÓK

- ÉLET
- HALÁL
- NYOMOR

URAI

A kábítószerek nagy csoportjai

1. Hallucinogének

- -békák buffotonin
- -csattanó maszlag
- - gombák

2. Stimulánsok

- -amphetaminok
- -kokain
- -Extasy, MDMA

3. Depresszánsok

- ópium
- -heroin
- -nyugtatók

4. Cannabisok

- -indiai vadkender

Az elgondolkodtató tények



- ⊙ **Európában, a kokain és az extasy több országban olcsóbb, mint volt 1990-ben,**
- ⊙ **a marihuána ára 12, a hasis ára 19, az amfetaminé 20, a kokainé 22, a heroiné 45, az ecstasyé pedig 47 százalékkal csökkent.**
- ⊙ **Afganisztánban évi 4100 tonna ópiumot termelnek (ez a világtermelés 89 százaléka) Európában 2004-ben, a rekordfogások évében összesen 19 tonna heroint foglaltak le.**

Magyar kutatási eredmények szerint 2004-ben a felnőtt lakosság 11-12 százaléka próbált ki illegális drogot.

Kábítószeres utcai ára Magyarországon

Marihuana: ≈ **500-2000 Ft/gramm**

Hasis: ≈ **2500 Ft/ adag**

Heroin: ≈ **12000 Ft/ gramm**

Kokain: ≈ **12-15000 Ft/gramm**

Amfetamin/ LSD: ≈ **3000 Ft /gramm**

Ecstasy: ≈ **1000 Ft /tabletta**

A drogfogyasztás stádiumai

- Kipróbálás
- Alkalmi
- Rekreációs (hétvégi)
- Rendszeres
- Intenzív
- Drogfüggőség
- Kényszeres használat



PROBLÉMÁS
DROGFOGYASZTÁS

A valóság

A fű **(kender, marihuána, hasis, cannabis)**

Szleng: joint, rakéta, gyep, zöld, spangli, marcsi, csoki, ganzsa, növény)

- A legnépszerűbb drog
- Mind szabadföldi, mind zárt térben való termesztése ismert
- Zöldes- barnás színű szárítmány
- Cigarettapapírba sodorva, vagy különleges pipában szívják




A marihuána

- Termesztéssel első sorban magyarok foglalkoznak
- A kapható szer nagyobb része hazai előállítású
- Jellemzője külföldi tőke, technológia, alapanyag
- Nő az átlagos hatóanyag (THC) tartalma, 1996-ban 2%, napjainkban 6%
- Külföldről, volt Jugoszlávián át, vagy Horvát-Szlovén, vagy Szerb-Magyar útvonalon kerül tranzitálásra – EU-ba
- Nő a fiatalok fizetőképes kereslete



Okoz-e függőséget?



- A fű tartós használata során fizikai függőségről alig beszélhetünk, bár ide sorolják a megvonáskor jelentkező rossz közérzetet és ingerültséget
- testi függőségének tekintetében ez elhanyagolható, hiszen a szer elhagyását nem követi testi rosszullét.
- A pszichikai hozzászokás viszont jelentősebb, ez szorosan kapcsolódik a fű nyújtotta "élményekhez", boldogságérzethez.

A marihuana veszélyei

- ✓ férfiaknál a vér tesztoszteronszintje és a spermiumok termelése csökken
- ✓ légúti panaszok, irritáció, allergia
- ✓ immunrendszer hanyatlása
- ✓ a gondolkodás, logikai funkciók sérülése,
- ✓ reflex megváltozása
- ✓ szorongás, zavartság, pánik alakulhat ki
- ✓ erős lelki függőség
- ✓ fogyasztása, tartása törvénybe ütközik



A valóság

- **Opiátok**
(*mákszármazékok, ópium, morfium, heroin, codein*)
(Szleng: OP, M, hercsi, hernyó, nyalcsi, barna, maki, mák, tea, csája, kompót, stb.)
- Máktea, zöld mák, kompót
- Az opiátok összességére igaz, hogy a viszonylag rövid használatot követően rendkívül erős fizikai és pszichés függőséget alakul ki.
- A pszichés függőség kezelése, gyakran éveket igénybe vevő feladat.

A használat veszélyei

- túladagolás: keringési és légzési zavarok, halál
- általános leromlott testi állapot, vitamin és kalciumhiány
- gyomor- és bélműködési zavarok
- májfunkciók csökkenése
- intravénás használat során: vérmérgezés, vénagyulladás, vérrögképződés, fekély, tályog, Hepatitis-B,-C,-D, AIDS
- szennyező anyagok véráramba jutása
- általános érdektelenség minden más iránt
- súlyos testi- és lelki függőség
- fogyasztása, tartása törvénybe ütközik

Heroin



- Török nagykereskedők, albán etnikumú kereskedők
- Elosztásban az albánok mellett az arabok is részt vesznek
- Az árusítás azonban magyar bűnözői csoportokhoz tartozik
- Jelentős befolyással bírnak az európai heroin ellátásban
- A „Balkáni” útvonal súlyozottabban a Török-Bulgár-Albán-Olasz vonalon folyik, a lefoglalások ezért hazánkban pl. csökkentek

A heroin

- Csempészás – Szeged-Hegyeshalom, E5-ös út, M1-es
- Az útvonalon vendéglátó helyeket, tanyákat, parkolókat bérelnek, vásárolnak,
- Legális tevékenységgel palástolják a tranzitálást, depózást
- Zöldség-gyümölcs export, import, személy és teherfuvarozás, faszállítás, fa-, és textilkereskedelem
- A csoportból 1-2 fő régóta van itt, gazdasági vállalkozásai vannak, ügyvédi, rendvédelmi, közigazgatási kapcsolatokkal rendelkezik



Kokain

- **Kokain**
(Kokain, crack)
(Szleng: kokó, koks, hó, kóla, rög, fehér)



- Gyógyászati és drogos szempontból a kokain sósavas sóját használják.
- Helyi érzéstelenítésként ma is használják szemészeti és gégészeti beavatkozásoknál.
- A kezdeti időkben stimuláló hatását is kihasználták - mint kedélyjavító
- Orron keresztül szippantják, vagy injektálják

Kokain

- Hazánkban csekély a felvevő piac, vagy bűnözői csoportok tagjai, vagy külföldiek – Budapest-Balaton
- Elsősorban tranzit vagyunk az olasz, illetve az angol, német célállomások felé
- Hollandia, Dél Amerika – légi szállítás
- Románia –Constanza hajóval, majd közúton
- Magyar drogfutárok, (nyelnek, testen, feloldva, rejtve) megbízók nyugat afrikaiak, nigériaiak



Kokain



A kokain veszélyei

- **túladagolás: kóma, halál**
- **nyálkahártyák hanyatló működése**
- **szippantás esetén: orrnyálkahártya kisebenedés**
- **vesekiválasztás csökkenése és lassulása**
- **májfunkciók csökkenése**
- **keringési zavarok**
- **szívritmuszavar, szívinfarktus**
- **intravénás használat során: vérmérgezés, vénagyulladás, vérrögképződés, fekély, tályog, Hepatitis-B,-C,-D, AIDS -pánikroham**
- **fokozott ingerlékenység**
- **súlyos testi- és lelki függőség**
- **fogyasztása, tartása törvénybe ütközik**

Party-drogok

- ***Speed***
(amfetamin, metamfetamin)
(Szlang: gyors, gyros, gonzálesz, gonzi, spuri, sebesség, fehér)
- A diszkók és partyk drogjának tekintik.
- Hatását a pörgés, álmatlanság, kitartó fizikai erő jellemzi.
- Felhasználási módok: a szippantás (orron keresztül), a tabletták és az intravénás használat.
- Enyhe fizikai függés kialakulhat, de számottevő a pszichés függőség.

Veszélyei

- túladagoláskor: keringési zavarok, túlhevülés, kezelhetetlenül magas vérnyomás, légzési nehézség, kóma, halál
- szippantás esetén: orrnyálkahártya kisebenedés
- kiszáradás
- vese kiválasztás csökkenése és lassulása, mellékvese-károsodás
- májfunkciók csökkenése, májkárosodás
- intravénás használat során: vérmérgezés, vénagyulladás, vérrögképződés, fekély, tályog, Hepatitis-B,-C,-D, AIDS
- pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek kialakulása
- motivációk, érdeklődés elvesztése
- ingerlékenység
- lelki függőség kialakulása
- fogyasztása, tartása törvénybe ütközik

Party-drogok

- **Ecstasy**
(XTC, MDMA)
(Szleng: *ex, x, bogyó, +ábrák neve: dollár, napocska, hógolyó, smile, elefánt, stb.*)
 - Napjainkban a legelterjedtebb drogok közé tartozik.
 - Ötvözi az amfetaminszármazékok gyorsító hatását és az euforizáló szerek boldogságérzetét, nem véletlenül a táncos, zenés helyek drogja.
 - Az illegális kereskedelemben dombornyomással készített "ábrás" tablettaként, kapszulában vagy poralakban lehet hozzájutni.
 - Többnyire szájon keresztül, de előfordul, hogy intravénásan juttatják a szervezetbe.

Veszélyek



- ◎ **Fizikai függőség nem alakul ki tőle, a pszichés függés pedig hasonló, mint a speed esetében. Pszichés és idegrendszeri betegségek kialakulásánál döntő szerepe lehet.**
- ◎ **kiszáradás, kezelhetetlenül magas vérnyomás, légzési nehézség, kóma, halál**
- ◎ **vesekiválasztás csökkenése és lassulása, vesekárosodás**
- ◎ **májfunkciók csökkenése, májkárosodás**
- ◎ **pánikroham, szorongás, téveszmés tünetek kialakulása**
- ◎ **motivációk, érdeklődés elvesztése**
- ◎ **ingerlékenység**
- ◎ **lelki függőség kialakulása**
- ◎ **fogyasztása, tartása törvénybe ütközik**

A tinédzserek szexualitása és a drog

- *Négyszer magasabb a fiatalkori terhességek száma a marihuána használók körében*
- *A szexuálisan aktív tinik körében 30 %-os a marihuánát, vagy alkoholt fogyasztók száma*

Kik az érintettjei a kábítószernek?

- az eljárás alá vontak
8-11 %-a fiatalkorú
55-58 %-a ifjú felnőtt, tehát
65-70 %-a 25 életév alatti(!)
- az eljárások 31-35 %-a indul terjesztői
magatartás miatt, de csak 15-19 %-a zárul
ezzel a minősítéssel,
- az eljárások 26-30%-a bejelentés alapján
indul,
- az eljárás alá vontak 10-13%-a függő,

Miért próbálják ki a fiatalok a drogokat?

- Új élmények szerzése
- „Nem mered” effektus
- Jó

Mire figyeljenek a szülők ?

- ⦿ **Megváltoznak a barátok**
- ⦿ **Negatív változások az iskolai eredményekben, iskolakerülés**
- ⦿ **Csökkenő aktivitás**
- ⦿ **Szobaittatók, léghfrissítők vagy dezodorok használata**
- ⦿ **Rövidítések, vagy „ kódok” használata a baráti beszélgetésekben**
- ⦿ **Ruházkodási szokások megváltozása**
- ⦿ **Csökkenő zsebpénz**
- ⦿ **Droghasználathoz szükséges eszközök birtoklása**
- ⦿ **Szemcseppek használata a bevérzett szemek kezelésére**
- ⦿ **Szájvíz vagy rágógumik használata az alkohol szagának elnyomására**



A HEROIN fogyasztáshoz való eszközök

